

Памятка для родителей по подготовке ребенка к проведению внутрикожных туберкулиновых проб (пр.Манту, Диаскинтест)

Туберкулиновые внутрикожные пробы Манту и Диаскинтест относятся к иммунодиагностике туберкулеза. Это диагностические тесты, позволяющие обнаружить реакцию иммунной системы на наличие микобактерий туберкулеза в организме человека. Иммунодиагностика проводится с целью раннего выявления туберкулеза среди детей и подростков.

Постановка внутрикожных туберкулиновых проб (Проба Манту, Диаскинтест) безвредна как для здоровых детей и подростков, так и для лиц с различными соматическими заболеваниями. Однако перенесенные заболевания и предшествующие прививки могут влиять на чувствительность кожи ребенка, усиливая или ослабляя ее. Это затрудняет последующую интерпретацию динамики чувствительности к туберкулину и является основой при определении перечня противопоказаний.

Противопоказания для постановки туберкулиновых проб :

- кожные заболевания, острые и хронические инфекционные и соматические заболевания (в том числе эпилепсия) в период обострения;
- аллергические состояния, ревматизм в острой и подострой фазах, бронхиальная астма, идиосинкразии с выраженными кожными проявлениями в период обострения.

С целью выявления противопоказаний врач (медицинская сестра) перед постановкой туберкулиновых проб проводит изучение медицинской документации, а также опрос и осмотр подвергаемых пробе лиц.

Не допускается проведение пробы Манту или Диаскинтеста в тех детских коллективах, где имеется карантин по детским инфекциям.

Туберкулиновые пробы ставят через 1 месяц после исчезновения клинических симптомов или сразу после снятия карантина.

Профилактические прививки также могут влиять на чувствительность к туберкулину. Исходя из этого туберкулинодиагностику необходимо планировать до проведения профилактических прививок против различных инфекций (АКДС, кори и т.д.). В случаях, если по тем или иным причинам туберкулиновые пробы производят не до, а после проведения различных профилактических прививок, туберкулинодиагностика должна осуществляться не ранее чем через 1 месяц после прививки.

Лицам, у которых в анамнезе имелись проявления неспецифической аллергии, пробу рекомендуется проводить на фоне приема десенсибилизирующих препаратов в течение 7 дней (5 дней до постановки пробы и 2 дня после нее).