

Дорогие мамы!

Туберкулез - это широко распространенная инфекция. Проблемы туберкулеза на сегодняшний день не решены, заболеваемость взрослых и детей до сих пор остается актуальной и вызывает опасения. Россия входит в число стран неблагополучных по этому заболеванию.

В этих условиях большое значение имеет профилактика заболевания.

Основной и самой важной мерой профилактики туберкулеза у детей остается иммунизация вакциной БЦЖ. В нашей стране она проводится уже более 60 лет и по Национальному календарю прививок является обязательной.

За эти годы накоплен большой практический опыт и доказана высокая эффективность вакцины в предупреждении заболевания. Благодаря этой прививке в России заболеваемость и смертность детей от туберкулеза во много раз снизились, снизилась инвалидность детей по причине последствий перенесшего туберкулеза, например, костной системы.

В современных условиях, когда широко распространены различные заболевания, особенно вирусные инфекции, и на ребенка воздействуют многочисленные вредные внешние факторы, сопротивляемость детей против туберкулеза ослабевает.

В результате не вакцинированные против туберкулеза дети даже при однократной встрече с больным туберкулезом быстро инфицируются и риск развития у них заболевания и даже смертельного исхода огромный. Лечится туберкулез длительно - многие месяцы.

Особенностью туберкулеза является тот факт, что он не имеет своих характерных клинических проявлений, заболевание развивается постепенно, бессимптомно и может проявиться только при прогрессировании процесса.

С целью предупреждения заболевания детей туберкулезом Российскими учеными специально для новорожденных разработана адаптированная щадящая противотуберкулезная вакцина БЦЖ-М. Это малодозная вакцина, но эффективность её от этого не снижается, что доказано многолетним применением.

Попадая в организм ребенка, она активизирует иммунную систему новорождённого и способствует выработке защитных антител против микобактерий туберкулеза, формируется длительный иммунитет к инфекции.

Ребенок рождается совершенно не защищенным от туберкулеза, поэтому вакцинация новорожденных БЦЖ-М проводится рано - на 3-7 сутки после рождения. Вакцина вводится внутрикожно, в верхнюю часть левого предплечья. В месте инъекции через 1,5-2 мес. образуется язвочка с последующим формированием к 4-5 мес. нежного рубчика

Но с годами вакцинальный иммунитет ослабевает и в 6 или в 7 лет возникает необходимость противотуберкулезной ревакцинация вакциной БЦЖ. Эти 2 прививки помогают ребенку защититься от заболевания туберкулезом.

Дорогие мамы!

Здоровье вашего ребенка во многом зависит от вас!

